



***Le dépistage génétique du
phéochromocytome et/ou
du paragangliome héréditaire***

Brochure d'information

Rédigée par :

**Pr Anne-Paule Gimenez-Roqueplo
Dr Khadija Lahlou-Laforêt
Mr Jean-Michaël Mazzella**


Consultation d'oncogénétique phéochromocytomes,
paragangliomes et autres tumeurs endocrines
Hôpital Européen Georges Pompidou
Paris

Question 1 : Qu'est-ce-qu'un paragangliome ?

Un *paragangliome* est une tumeur rare qui se développe à partir des *paraganglions* qui sont des groupes de cellules largement répartis dans l'organisme. Les paragangliomes sont le plus souvent localisés dans le cou (glomus carotidien et glomus vagal), la tête (glomus tympanique), le ventre (thorax et abdomen) et le petit bassin.

Question 2 : Qu'est-ce-qu'un phéochromocytome ?

Un *phéochromocytome* est un paragangliome qui produit les hormones appelées *catécholamines* et se développe au-dessus des reins dans la glande surrénale. Quand on parle des catécholamines (adrénaline, noradrénaline, dopamine) on parle souvent des *hormones du stress* car elles sont habituellement sécrétées en réponse aux émotions et provoquent une accélération du cœur, des sueurs, des tremblements et une sensation d'anxiété.



Question 5 : Les paragangliomes et les phéochromocytomes sont-ils des maladies génétiques ?

Dans le cas des paragangliomes ou phéochromocytomes familiaux la maladie est génétique. Ce qui veut dire que, dans le patrimoine génétique (appelé *ADN*) de l'individu atteint, il existe une anomalie génétique (*mutation*) sur un gène de prédisposition qui explique la maladie et qui peut être diagnostiquée par *un test génétique* dans la plupart des cas.

Question 6 : Quels sont les gènes en cause dans les formes familiales ?

Pour le paragangliome héréditaire, il s'agit des gènes *SDHD*, *SDHB*, *SDHC*, *SDHA* et *SDHAF2* ; pour le phéochromocytome héréditaire, des gènes *TMEM127* et *MAX* ; pour la maladie de von Hippel Lindau, du gène *VHL* ; pour la néoplasie endocrinienne multiple de type II du gène *RET* et pour la neurofibromatose de type I du gène *NF1*.

Question 7 : Comment ces gènes se transmettent-ils ?

Les généticiens disent que ces gènes se transmettent sur le mode *autosomique dominant* ce qui veut dire qu'un sujet porteur d'une mutation a un risque sur deux (50%) de la transmettre à ses descendants. Habituellement quand on a une mutation dans son génome, on est à risque de développer la maladie.

Pour les gènes *SDHD* et *SDHAF2*, un individu sera à risque de développer la maladie lorsqu'il aura hérité la mutation de son père. S'il reçoit une mutation *SDHD* ou *SDHAF2* de sa mère, il ne développera *quasiment jamais* la maladie mais pourra la transmettre à la génération suivante.

Question 8 : Quels sont les intérêts du diagnostic génétique dans le paragangliome et le phéochromocytome ?

La certitude qu'un paragangliome ou qu'un phéochromocytome est d'origine génétique permet *d'adapter la prise en charge et la surveillance* du patient. Un dépistage par le test génétique pourra être proposé à la famille du patient atteint.

Question 9 : Dans ce cadre, un accompagnement psychologique peut-il être indiqué ?

Un diagnostic génétique peut représenter *un choc psychologique* si l'annonce du résultat n'est pas suffisamment préparée. La consultation avec un psychiatre ou un psychologue peut permettre au patient d'exprimer les aspects émotionnels liés au contexte médical et familial et d'anticiper ses réactions aux résultats ultérieurs. Dans certains centres, cette rencontre est organisée de façon systématique.

Question 10 : Si le résultat du test génétique est positif et qu'il s'avère que je suis porteur d'une mutation, quel est le risque de développer une tumeur ?

Le risque de développer un phéochromocytome ou un paragangliome est souvent plus élevé chez le sujet atteint d'une forme génétique. Donc si le test est positif, la présence de tumeurs éventuelles sera recherchée par les médecins et votre surveillance sera rapprochée et adaptée à votre maladie génétique.

Question 11 : Existe-t-il un traitement curatif ou préventif des tumeurs ?

A l'heure actuelle, le seul traitement curatif des paragangliomes et des phéochromocytomes reste la chirurgie et il n'existe pas de traitement préventif. Dans certains cas, les patients peuvent aussi être traités par radiothérapie.

Question 12 : Si je suis porteur d'une mutation, quels sont les risques pour mes enfants ?

Si vous êtes porteur d'une mutation, le risque pour chacun de vos enfants qu'ils l'aient reçue dans leur génome est de 50%.

Question 13 : Si je ne suis pas porteur d'une mutation, quels sont les risques pour mes enfants ?

Si vous n'êtes pas porteur, vos enfants n'ont pas plus de risque que celui qui existe dans la population générale de développer un paragangliome ou phéochromocytome pendant leur vie.